

## 5. FELIS *Manul*. TAB. I.

F. cauda elongata annulata, corpore ex albido-flavescente, punctis verticis strigisque paroticis nigris.

*Felis Manul*. *Pall. itin. III. app. p- 692. n. 2. Act. Petro-*  
*pol. tom. V. p. 1. Schreber. mam. III- p. 406. Zimmerm.*  
*Zool. geogr- p. 667.*

Rossis in Sibiria *Stepnaja Koschka* (*Felis desertorum*) vel *Ka-*  
*mennaja Koschka* (*Felis rupestris*.)

Kirgiso - Tataris *Manul*. Baschkiris *Jalam*.

Mongolis *Manol*. Bocharis *Malém*.

In rupestribus apricis Tatariae Mongoliaeque desertae et intra fines Imperii circa australia Uralensis jugi promontoria, Altaicum jugum et in regione trans-baicalensi satis frequens species, perque omnem mediam Asiam diffusa. In valde septentrionalia non, ut Lynces, evagatur. In antris et rupestribus spelaeis latitat. Iracunda,



*Felis Manul. Pall.*

malefica, minoribus animalibus et in Davuria praesertim Lepusculis victitans. A Cato fero praesertim colore, vellere, proportione, capite praesertim majore, et longiore cauda, numeroque molarium diversa, alias simillima. Moribus non dissimilis. Stertorosa iracundia et vellere Lynxem refert. Pelles a Bocharis satis vili pretio afferuntur.

*Descr.* *Magnitudo* supra vulpem; facies Lyncis et proportiones eadem, praeter caudam. *Color* in toto corpore Lyncis, fulvescente exalbidus, pilis raris fuscis obnebulatus, subtus pallidus. *Nasus* nuda parte fuscescit, labiaque margine nudo nigra, *superius* sulco profundo nigro sub septo divisum, *inferius* crista pone caninos integra, arguta. *Dentes* maxillares *supra* utrinque bini, quorum posterior maximus, *subtus* terni, quorum minor omnibus anterior. *Lingua* medio disco uncinulis rigidis hispida. *Mystaces* 4 ordinum, albi, basi undulati, in supero ordine setis 2 majoribus nigris. *Oculi* torvi obliquati: *palpebrae* margine nudo nigricantes; *cilia* palpebrae superioris tantum in medio; *periophthalmium* crassum, rugosum, instita nigra marginatum; *Irides* dilute fulvae, *pupillis* oblongo-obliquis. *Verruca* supraciliaris insignis, flavescens, setulis circiter octonis albedo flavescens, nona antica nigra radiata. *Aures* breves, latae, rotundatae, muticae, *exterioris* marginis lobulo intus fere medio rotundato, *interiore* versus basin lamella obsoleta duplicatae, extus vestitae vellere denso, molli, uniformiter flavescens-pallido, intus nuda fusca, sed flabello e pilis albis, subreflexis, a basi auris orto obtextae. — *Artus* robustiores, procerioresque, quam in Cato, proportione Lyncis vel Oncae; *palmae* latere utroque fulvescentes nigro-villosae usque ad callum carpi; *plantae* subtus villosa tophoso, intense fulvo, versus calcaneum exterius striga nigra marginatae, digitis itidem subtus nigris et litura utrinque pone callum metatarsi. *Falculae* pedum albi-

dae, vaginis cutaceis denudatis. — *Cauda* villo largo cylindracea, lutescente-pallida, corpori subconcolor, annulis circiter novenis primoribus fuscis, extremo nigris subtus dilatatis, quorum intermedii magis remoti; apex caudae, fasciaque ab apice tres ultimos annulos longitudinaliter connectens, atra, pilo nitidiore. *Color* circa nasum flavescens, gulae albus, versus pectus cinerascens, reliquo corpori supra exsolete fulvescentem extus albido inumbratus, summis pilorum in dorso nigrescentibus. Vertex inter oculos et aures *punctis* creberrimis nigris maculatus; *linea* sub oculis longitudinalis, *strigaeque* hinc binae paroticae oblique parallelae nigrae. Reliquum corpus immaculatum; in quibusdam per posticum dorsum liturae virgate exsoletissimae. *Scrotum* masculo prope anum insigne, cum praeputio albo-villosum. — *Pondus* librarum sex cum dimidia, aliis  $7\frac{1}{2}$ . *Mensura* a summo naso ad anum 1'. 7". 3". capitis 4". 6", caudae sine villo pollicari 9". altitudo antica ad spinam 10". 8". postica 11". 9". circumferentia oris 2". 5". oculi a naso distantia 1". apertura  $9\frac{1}{4}$ ". distantia ad aures 1". circumferentia rostri 4". distantia oculorum 1". 1". aurium 2". 5". circumferentia maxima capitis 8". 2". mensura anti-brachii 4". 5". palmae 3". 2". falcularum 8". tibiae 4". 3". plantae 4". 9". falcularum plantae  $6\frac{1}{2}$ ". circumferentia colli 7". 5". thoracis 10". 9". abdominis 9". 10". *Omentum* utrumque pinguisimum, majus prolixum et pinguedo sub pelle dorsi multa. *Hepar* septemlobum  $2\frac{1}{2}$  unciarum, multiforme, *sinistro lobo* ampliore, ovali-oblongo, subtus fisso, margine crenato, *dextro* semicordato, subtus carinato, cum adsidente *parvulo*; intermediorum *altero* parvo, *dexteriore* majore, ovato-quadrangulo, *minuto* angulato stipato; *Spigeliano* linguiformi. *Lien* linearis, tripollicaris, sesquidrachmalis, altero extremo latior pediformis, omento externe inhaerens. *Ventriculus* ovatus, praeter productionem pylori, fundo diaphragmati obversus. *Intestinum* tenue

3'. 3". o. *area glandulosa* bipedali distantia a pyloro, altera majore longitudinali per tres pollices ante coecum. *Coecum* breve, conico-incurvum, obtusum; *crassum* 12". 6''. Ad ani marginem utrinque *glandula* acinosa ovalis, mole fabae extus lutea, cavernulosa, ostiolo ichorem flavum eructans. *Penis* glande cylindrica, obtusa, apice glabra, circa basin papillis sparsis mollibus submuricata, longitudine  $2\frac{1}{4}$ ". *ossiculum* continente paulo brevius. *Pulmo* uterque trilobus, *dexter* cum *accessorio* lobo azygo subbicruri. In *scelet*o costae 13 parium, quarum 9. vera; *vertebrae* lumbares 7. sacri tres, caudae 20, praeter apicem cartilagineum. *Claviculae* musculis inhaerentes ad superiorem marginem pectoralis, longitudine (cum incrustante extrema cartilagine) 6''.

*Not.* Proportiones, habitus et altior ingressus suspicionem mihi movent, ab hac fera specie ortam esse *Felem* sic dictam *angorensem*, pilo sericeo lanatam, quae etiam apud Sinas domestica datur. Multis enim haec a *Cato* differt, licet mansueta cum hoc facile coëat. Comparatio anatomica utriusque dilucidare hoc forte posset.